

Au Maroc, le Cancer du sein est le premier type de cancers chez la femme. Il demeure un vrai problème de santé publique. Dans la province d'Ouarzazate, il constitue un problème de santé publique préoccupant à cause de plusieurs barrières d'accès et des facteurs socioculturels qui influencent d'une manière négative la présentation des femmes pour la détection précoce du Cancer du sein et pour le traitement. Pour faire face à ces problèmes, le Ministère de la santé en partenariat avec la Fondation Lalla Salma a élaboré un Plan National de Prévention et Contrôle des Cancers 2010-2019. Dans ce cadre, des actions importantes ont été réalisées. D'autres actions efficaces de prise en charge globale des femmes atteintes du Cancer du sein au Maroc méritent d'être réalisées.

Objectif

Notre étude vise à décrire et analyser les facteurs socioculturels qui influencent la participation des femmes rurales à la participation au traitement, à la province d'Ouarzazate.

Méthodes

Nous avons réalisé une étude transversale descriptive et analytique du 1 au 27 juin 2019. Nous avons utilisé une méthode de recherche à visée qualitative et quantitative. Nous avons ainsi utilisé, dans un processus logique, 3 techniques de recherche ; analyse documentaire du registre du Centre de Référence de Détection Précoce du Cancer du sein et col de l'Utérus (CERDEPC) et des rapports annuels, entretiens semi-structurés avec 10 femmes et un questionnaire élaboré avec un échantillon de 20 femmes, fait à choix raisonné. Une analyse statistique a été faite sous Epi info par la suite. Une analyse du contenu a été menée aux données qualitatives recueillies.

Résultats

Les résultats de l'étude indiquent que la classe d'âge des femmes est 30-75 ans. La majorité est mariée. Elles ont le RAMED. Elles ont un niveau bas d'instruction. Elles sont analphabètes. Elles ne prennent pas en charge leurs enfants. Elles ont plus de barrières d'accès au dépistage et au traitement que de facilités. La participation aux activités de démystification et de sensibilisation sur le Cancer du sein est faible sinon nulle. Le contexte culturel (habitudes traditionnelles et perceptions autour de la maladie) et l'appréciation du système de santé influencent d'une manière négative la participation des femmes au traitement. Le soutien familial, les significations attribuées au Cancer du sein et les réactions émotionnelles aux symptômes influencent d'une manière positive la participation des femmes au traitement.

Conclusion:

Les 5 facteurs socioculturels associés aux barrières d'accès au traitement plus qu'au dépistage influencent clairement la participation des femmes au traitement. Ils le conditionnent. Le niveau faible des femmes en informations et connaissances sur le Cancer du sein, ses facteurs du risque et sur le dépistage et traitement influencent les facteurs socioculturels.